Antidotová lékárna KPL při VFN a 1. LF UK v Praze

(konsignační sklad FN Olomouc, Oddělení urgentního příjmu)

telefonní kontakt na urgentní příjem: 588 442 653

Název léku	Počet balení	Účinná látka	Obsah balení	Počet dávek (dosp.) na jedno balení	Intoxikace (noxa)	Přibližná spotřeba pro 1 pacienta (dospělý 70 kg, dítě 30 kg)
4-DMAP 50mg/ml inj sol 5x5ml	3	4-dimethylaminophenol-hydrochlorid	5 ampulí o obsahu 5 ml/250 mg	3-5	Různé noxy způsobující methemoglobiné mii	**Dospělý:** 1-1,5 ampule (250 mg na dávku, za 4-6 hod lze podat ještě polovinu úvodní dávky) **Dítě:** 3,25 mg/kg , za 4-6 hod lze podat ještě polovinu úvodní dávky)
ANTICHOLIUM amp	2	physostigmini salicylas 2 mg/amp	5 amp po 5 ml	2	atropin, scopolamin, hyosciamin	**Dospělý:** 1/2 až 1 balení (2 mg úvodem, pak 1-4 mg po 20 min); **Dítě:** 30 kg asi 1/2 balení; **Batole:** 1 amp (0,5 mg úvodem, pak 0,5 mg po 5 min do celkové dávky 2 mg
ANTIVIPMYN TRI	0	Polyvalentní antisérum s kapacitou neutralizovat Bothrops sp 780 DL50; Crotalus sp 220 DL50; Lachesis sp 200 DL50	1 lahvička suché substance + 10 ml roztoku k ředění	0,1-1	uštknutí exotickými hady: chřestýši křovináři ploskolebci	Podle tíže otravy: **Dospělý** 3-16 lahviček na úvod, 5-8 lahviček udržovací dávka **Dítě** 6-10 lahviček na úvod, 5 - 16 lahviček udržovací dávka
BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent)	0	Antitoxin sérotypu A , B, C, D, E, F, G	1 skleněná injekční lahvička obsahující 10-20 ml antitoxinu sérotypu A (> 4,500 U=jednotek), B (> 3,300 U), C (> 3000 U), D (> 600 U), E (> 5,100 U), F (> 3,000 U), G (> 600 U)	1	botulismus	**Dospělí:** 1 lahvička **Děti:** 20-100% dávky pro dospělého (dle váhy)
CYANOKIT lag.	4	hydroxocobalamin 5 g/lag	1 lag s 5 g lyofilizátu (suchá substance)	1	kyanidy, kouřové plyny	**Dospělý:** 1-2 balení (5-10 g) **Dítě:** 1/2-1 balení (asi 2,5-5 g)
DESFERAL amp.	2	deferoxamini mesilas 500 mg/ lag	10 lag po 500 mg suché substance	dle závažnosti otravy	intoxikace železem, hliníkem	**Dospělý a dítě** kontinuální infuze ve formě 10% roztoku ve vodě pro injekce ředěného FR nebo 5% glukózou rychlostí 15 mg/kg/hod, do celkové dávky 80 mg/kg/24 hod
DIGIFAB lag(1)	2	digoxin reaktivní Fab protein 40 mg/lag	1 amp po 4 ml	dle závažnosti	digoxin	**1 amp/40 mg Digi Fabu váže přibližně 0,5 mg digoxinu;** **Intoxikace - dospělý i dítě** 10 až 20 amp; **Předávkování - dospělý** asi 6 amp , dítě 1 amp
DIGIFAB lag(2)	0	digoxin reaktivní Fab protein 40 mg/lag	1 amp po 4 ml	dle závažnosti	digoxin	**1 amp/40 mg Digi Fabu váže přibližně 0,5 mg digoxinu;** **Intoxikace - dospělý i dítě** 10 až 20 amp; **Předávkování - dospělý** asi 6 amp , dítě 1 amp
DIMAVAL amp. 1x5ml	0	DMPS-sodium 250 mg	1 ampule po 5 ml (250 mg DMPS sodium)	dle závažnosti otravy	rtuť, olovo	**Dospělý** 6 x 1 amp/24 hod 1. den, 4 x 1 amp/24 hod 2. den, 3 x 1 amp/24 hod 3. den, 2 x 1 amp/24 hod 4. den
DIMAVAL amp. 5x5ml	0	DMPS-sodium 250 mg	5 ampulí po 5 ml (250 mg DMPS sodium)	dle závažnosti otravy	rtuť, olovo	**Dospělý** 6 x 1 amp/24 hod 1. den, 4 x 1 amp/24 hod 2. den, 3 x 1 amp/24 hod 3. den, 2 x 1 amp/24 hod 4. den
DIMAVAL cps.	0	DMPS-sodium 100 mg/cps	20 cps po 100 mg	dle závažnosti otravy	rtuť, olovo	**Dospělý** **akutní otrava:** 12 x 1-2 cps/24 hod; **chronická otrava:** 4 x 1-2 cps/24 hod.
DITRIPENTAT-HEYL	0	calcium trinatrium pentetat 1 g/5 ml	5 ampulí po 5 ml	dle závažnosti otravy	Pb, Zn, Fe, Mn, Cr, Pt a jiné radioaktivní kovy	**Dospělý:** obvykle 1 amp/den; **Dítě:** 25 - 50 mg/kg; vždy podle závažnosti otravy
FOMEPIZOLE SERB 5MG/ML concentrate for INJ SOL 5x20ML	5	fomepizol	5 amp. á 20 ml	2	Otrava etylenglykolem, dietylenglykolem a metanolem	**Dospělí:** 20-40 ampulí á 100 mg/20ml **Děti:** 10-15 mg/kg váhy 1 dávka, celkem 2-6 dávek dle závažnosti otravy
IRENAT TROPFEN	0	natriumperchlorat 300 mg/1 ml	40 ml gtt	dle závažnosti otravy	radioaktivní jód (blokáda syntézy hormonu štítné žlázy)	10-20 kapek/den, výjimečně až 50 kapek/den
Irenat tropfen 300mg/ml	0	chloristan sodný 300 mg/15 kapek	1 lahvička po 40ml	dle závažnosti otravy	intoxikace těžkými kovy a radionuklidy	**Dospělý:** 40-50 kapek první 1-2 týdny (odpovídá 800-1000 mg chloristanu sodného), ve výjimečných případech 75kapek (odpovída 1500mg chloristanu sodného) udržovací dávka 20 kapek (odpovídá 400mg chloristanu sodného) denně **Děti:** 6-14 let: 3- 6 nebo 8-12 kapek denně (odpovídá 60-240 mg chloristanu sodného)
LEGALON SIL lag	12	silibinin-C-2,3dihydrogensukcinát 350 mg silibininu/lag	4 lahvičky s 598,5 mg suché substance	1	A. phalloides	**Dospělý:** 1 balení/den (1,4 g silibininu/24 hod); **Dítě:** 1/2 balení/den (asi 600-00 mg/24 hod)
Methylthioniniumchlorid Proveblue 5mg/ml inj. sol 5x10ml	3	methylthioninii chloridum 5 mg/ml 2 mg/amp	5 ampulí o obsahu 10 ml/50 mg	1-2 dávky	Různé noxy způsobující methemoglobiné mii	**Dospělí**: 1 balení (1-2 mg/kg, lze za 1 hod. opakovat), **Dítě**: dávkování jako dospělí, **Kojenec** do 3 měs.:0,3-0,5 mg/kg, lze za 1 hod. opakovat
NATRIUMTHIOSULFÁT 10% amp	15	thiosíran sodný 1 g/amp	5 amp po 10 ml	0.3	kyanidy	**Dospělý:** 2-7 balení (asi 7-35 g) **Dítě:** 3 ampule až 3 balení (asi 3-15 g)
RADIOGARDASE-CS - 36 kapslí	0	ferric hexacyanoferrat (II) 500 mg /cps	36 cps po 500 mg	dle závažnosti otravy	thallium, radioaktivní cesium	**Dospělý a dítě:** 3 až 20 g denně v 3-4 jednotlivých dávkách, např. 3 x 6 cps/24 hod.
SNAKE VENOM ANTISERUM I.P	0	čištěné sérové koňské imunoglobuliny proti jedu hadů: kobry obojkové, mamby a zmijí jižní a střední Afriky	1 lahvička suché substance + 10 ml roztoku k ředění	0,1 - 0,5	uštknutí exotickými hady: kobra indická, bungar modravý, zmije řetízková, zmije paví.	Podle tíže otravy: **Dospělí i děti** 2-10 lahviček
SUCCICAPTAL cps	5	succimer 200 mg/cps	15 cps po 200 mg	0.3	olovo	**Dospělý:** 3 balení na úvod/5 dní (2,1 g /den), pak až 6,5 balení (1,4 g /den) až 14 dní; **Dítě:** 1,5 balení na úvod/5 dní (900 mg/den), pak až 3 balení (300 mg/den)
TOXOGONIN amp	5	obidoxim chlorid 250 mg/amp	5 amp po 1 ml k aplikaci i.v.	1	organofosfáty při současné léčbě atropinem	**Dospělý:** 1-2 balení (250 až 500 mg úvodem, pak v infuzi až do 1-2 g) **Dítě:** 1/2 - 1 balení (120-250 mg úvodem, pak v infuzi až do 0,5-1 g)
VIPERATAB lag.	0	antigen vázající fragmenty Fab 100 mg/amp	2 amp po 4 ml	1	uštknutí zmijí	**Dospělý:** 1 balení (2 amp) úvodem v infúzi během 30 min, při progresi příznaků ještě 1 balení
VIPERFAV	3	Koňský imunoglobulin s fragmentem F(ab')2 vážícím jed evropských zmijí, který neutralizuje: Jed Vipera aspis (zmije skvrnitá)≥ 1000 UE* Jed Vipera berus (zmije obecná) ≥ 500 UE* Jed Vipera ammodytes (zmije růžkatá) ≥ 1000 UE*	1x 4 ml koncentrát pro infúzní roztok	1	uštknutí hadem	1 (max 3) balení (dospělý 70 kg, dítě 30 kg)
ZINK-TRINATRIUM-PENTETAT inj.	0	zinc trinatrium pentetat 1055 mg/5 ml	5 ampulí po 5 ml	dle závažnosti otravy	radionuklidy těžkých kovů (Am, Pt, Cm, Cf, Bk)	**Dospělý:** obvykle 1 amp/den; **Dítě:** 25-50 mg/kg /den; vždy dle závažnosti

Stav k 11.11.2026