Antiinfektiva - lékárna TIS při KPL VFN a 1. LF UK v Praze

	Obchodní název léku	Generický název	Obsah balení	Počet balení na jednu kúru	Zásoby TIS	Indikace	Aplikace
Antimykotika	**ANCOTIL**	flucytosin	100 tbl. á 500 mg	1	**0 balení**	Léčba kryptokokové meningitidy	do 24 hodin
Antiséra	**Antidiphtheria Serum BUL BIO**	imunoglobulin proti toxinu Corynebacterium diphtheriae	1 amp. á 5000 IU (10 ml)	individuální (500-3000 IU/kg i.m. nebo s.c.)	**50 balení**	záškrt	co nejdříve
	ANTYTOKSYNA BOTULINOWA ABE	antitoxin botulinu	1x10ml	5-10 ampulí	**0 balení**	léčba botulismu	co nejdříve
	Berirab P (2ml)	imunoglobulinum humanum rabicum	1 injekční stříkačka à 2 ml/300 IU	individuální (20 IE/kg i.m.)	**39 balení**	antirabické sérum	co nejdříve
	Berirab P (5ml)	imunoglobulinum humanum rabicum	1 injekční stříkačka à 5 ml/750 IE	individuální (20 IE/kg i.m.)	**0 balení**	antirabické sérum	co nejdříve
	BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent)	Botulism Antitoxin Heptavalent	1 skleněná injekční lahvička obsahující 10-20 ml antitoxinu sérotypu A (> 4,500 U=jednotek), B (> 3,300 U), C (> 3000 U), D (> 600 U), E (> 5,100 U), F (> 3,000 U), G (> 600 U)	1	**6 balení**	botulismus	co nejdříve
	DIPHTHERIA ANTITOXIN B.P.	Imunosérum proti diphterickému záškrtu	10000 I.U. á 10ml	1-5 ampulí	**0 balení**	léčba záškrtu	do 6 hodin
	Varitect CP	lidský imunoglobulin anti-varicella zoster	1 lag. à 5 ml (125 IU)	1 lag. à 5 ml (pro novorozence)	**44 balení**	profylaxe osob vystavených viru varicelly	do 6 hodin
Antituberkulotika	**Capreomycin**	capreomycin	1 lag. à 1 g	30 lag. à 1 g	**0 balení**	antituberkulotikum	do 48 hodin
	CICLOSERINĂ	cicloserin	100 cps.	1 balení	**0 balení**	antituberkulotikum	do 48 hodin
	Cykloserin	cykloserin	100 cps à 250 mg	1 balení 100 cps. à 250 mg	**0 balení**	antibiotikum, antituberkulotikum	do 48 hodin
	Eremfat	rifampicin	1 lag. à 600 mg	20 lag. à 600 mg	**19 balení**	antituberkulotikum	do 12 hodin
	ISOZID	isoniazid	10 amp. á 0,5N, tj. 0,5 g	2 balení	**0 balení**	antituberkulotikum	do 12 hod
	Lamprène	clofazimin	100 tbl. à 50 mg	1 balení à 100 tbl. à 50 mg	**2 balení**	antituberkulotikum	do 48 hodin
Antiparazitika	**ARTESUNATE AMIVAS 110 mg inj pso lqf 2+2x12ml**	artesunat	2 ampule á 110mg artesunátu, 2 ampule á 12ml rekonstitučního roztoku	individuální (2,4 mg/kg i.v.)	**13 balení**	antimalarikum	co nejdříve
	Biltricide	praziquantel	6 tbl à 600 mg	1 balení à 6 tbl à 600 mg	**0 balení**	antiparazitikum (tasemnice)	do 48 hodin
	Glucantime	meglumin antimoniát	5 amp. à 1,5 g/5 ml	10 - 14 balení à 5 amp. à 1,5 g/5 ml	**30 balení**	antiparazitikum (leischmanióza)	do 48 hodin
	IMPAVIDO	miltefosin	56 cps á 50 mg	3	**4 balení**	Léčba viscerální, mukokutánní a kožní leishmaniózy	do 48 hodin
	Malacef 60 1x60mg+1x1ml	artesunát	1 inj. á 60mg+1ml	3 amp à 0-12-24h	**0 balení**	antimalarikum	do 6 hodin
	Malacef 60 6x60mg+6x1ml	artesunát	6 inj. á 60mg+6x1ml	3 amp à 0-12-24h	**0 balení**	antimalarikum	do 6 hodin
	Pentacarinat	pentadimin	5 lag. à 300 mg	20 lag. à 300 mg	**11 balení**	antiparazitikum (leischmanióza, Pneumocystis carinii, Trypanosoma	do 12 hodin
	Praziquantel	prazikvantel	600 mg tablety á 6	individuální (20-25 mg/kg 3x denně s odstupem 4-6hodin po dobu 1 dne)	**14 balení**	antihelmintikum	co nejdříve
	Primacin	primaquin	56 tbl. à 7,5 mg	závisí na věku, případné rezistenci atd.	**0 balení**	antimalarikum	do 48 hodin
	Primaquine	primaquin	100 tbl. à 15 mg	1 balení 100 tbl à 15 mg	**2 balení**	antimalarikum	do 48 hodin
	Quinimax	chinin	3 amp. à 250 mg/2 ml	9 - 15 amp. à 250 mg/ 2 ml	**0 balení**	antimalarikum	do 6 hodin
Antivirotika	**Rapivab**	peramivir	3 amp. à 200 mg/20 ml	1 balení (600 mg jednorázově v i.v. infuzi po dobu 15-30 min)	**8 balení**	léčba akutní nekomplikované chřipky	do 48 hodin od nástupu příznaků chřipky

Stav k 11.11.2026